



¡Aprenda más!

SEMILLAS 2025 - INSTRUCCIONES DE CULTIVO



EJOTES PROVIDER

Este frijol enano se puede sembrar antes que otros frijoles porque tolera los suelos fríos. Las plantas compactas son fáciles de cultivar y se adaptan a diversas condiciones climáticas y de suelo.

SIEMBRA DIRECTA: Después de la última helada o cuando la temperatura diurna del suelo alcance, en promedio, los 60°F, siembre las semillas a una distancia de aproximadamente 2" y 1" de profundidad, en filas separadas por 20-36". La temperatura óptima del suelo para la germinación es de 70-90°F. Los inoculantes pueden aumentar el rendimiento. Para un suministro continuo, realice siembras sucesivas cada 2-3 semanas hasta mediados del verano.

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 50



PEPINO GATEWAY

TRASPLANTE: Siembre 1 o 2 semillas por recipiente al interior, entre 3 y 4 semanas antes del trasplante. Mantenga la temperatura por encima de los 70°F durante el día y 60°F por la noche. Trasplante a una distancia de 12" en filas separadas por 5-6'. No altere las raíces al trasplantar.

SIEMBRA DIRECTA: Espere hasta que la temperatura del suelo esté a un mínimo de 50°F o hasta los 70°F. Siembre 2 semillas por pie o en montículos, a una profundidad de ½", en filas separadas por 6'. Aclare a una distancia de 12".

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 56



PIMIENTO DULCE GITANO

Pimiento dulce híbrido con una producción prolífica de frutos (de 2x4" de tamaño) que pasan de amarillo a naranja y luego a rojo.

SIEMBRA AL INTERIOR: Siembre las semillas a una profundidad de ¼", aproximadamente 8 semanas antes de trasplantarlas al exterior. Manténgalas húmedas. Las plántulas emergen dentro de 10-21 días a una temperatura de 75-80°F. Cuando aparezcan las primeras hojas verdaderas, trasplántelas a macetas de 2-4". Antes de trasplantar, trasládelas a un área protegida al exterior durante una semana. Trasplántelas al lugar de cultivo definitivo cuando haya pasado toda amenaza de heladas. Deje un espacio de 18" entre plantas, en filas separadas por 24".

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 65



TOMATE AMISH PASTE

TRASPLANTE: No se adelante demasiado: trasplantar plantas ahiladas, con raíces comprimidas o floreciendo puede retrasar su crecimiento y reducir su producción inicial. Entre 5 y 6 semanas antes del trasplante, siembre 1 semilla/recipiente a una profundidad de ¼"; cubra ligeramente. Mantenga a 75-85°F con humedad moderada. Al aparecer la primera hoja verdadera, trasplante a macetas de hasta 4". Mantenga una temperatura constante de 60-70°F y use fertilizante completo hasta que se endurezca. Las luces suplementarias y las temperaturas bajas nocturnas minimizan el ahilamiento. Para una cosecha temprana, plante bajo una cubierta de filas alrededor de la última helada. Proteja las plantas de temperaturas nocturnas inferiores a 45°F. Esparza estos tomates entre 12-24" en filas con separación de 4 a 6'. Plante profundamente para estimular el enraizamiento adventicio. Al plantar, riegue las plántulas con una solución de fertilizante alto en fósforo para aumentar el rendimiento temprano.

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 85



CALABAZA BELLOTA HONEY BEAR

TRASPLANTE: Siembre de 2 a 3 semillas en contenedores de 2". 3 semanas antes de trasplantar. Aclare con tijeras hasta que quede 1 planta por contenedor. Endurezca las plantas de 4 a 7 días antes del trasplante. Trasplante cuando haya pasado la amenaza de heladas o la temperatura del suelo alcance los 65°F. Manipule las plántulas con cuidado para minimizar el daño a las raíces.

SIEMBRA DIRECTA: Siembre 2 semillas a una distancia de 5 a 6 pies entre plantas y a una profundidad de ½ a 1 pulgada. Aclare a 1 planta por intervalo después de que las plántulas se establezcan.

DISTANCIA ENTRE PLANTAS: Esta planta de porte arbustivo requiere de una distancia de 3 a 6 pies entre filas. El espacio entre filas para esta fruta de tamaño pequeño es de 18 a 24 pulgadas.

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 85



ESPINACA SUNANGEL

SIEMBRA DIRECTA: Para hojas tiernas: siembre de 3 a 5 semillas por pulgada en filas separadas por al menos 2". Para manojos de tamaño completo: siembre 10 semillas por pie a una profundidad de ½" en filas separadas por 12 a 18".

SIEMBRA SUCESIVA: Para un suministro continuo, siembre cada 7-10 días.

COSECHA: Para hojas tiernas: coseche las hojas al tamaño deseado en 3 a 5 semanas, córtelas por encima de la placa basal para cultivos de cosecha continua.

Para tamaño completo: coseche los tallos largos justo por encima o por debajo de la placa basal para cosechar la planta entera.

DÍAS HASTA LA MADUREZ: 27



placa basal



Juntos podemos terminar con el hambre en Wyoming.

nohungerwyo.org

5001 Central Avenue, Cheyenne, WY 82009



Extension

